

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

御纂醫宗金鑑卷四十九

詳校官太醫院醫士臣程泰

編修臣倉聖脈覆勘

總校官中書臣朱鈺

校對官監丞臣張曾炳

校對官中書臣蔣寬

謄錄舉人臣李全玉

謄錄監生臣劉廷勳

欽定四庫全書

御纂醫宗金鑑卷四十八

編輯婦科心法要訣目錄

驚悸恍惚證治

茯神散

加味歸脾湯

妄言見鬼發狂證治

妙香散

小調經散

虛煩證治

人參當歸湯

當歸補血湯

失笑散

發渴證治

參麥飲

加味四物湯

竹葉歸耆湯

四物湯

欬嗽證治

旋覆花湯

麥味地黄湯

加味佛手散

六味地黄湯

衄血證治

人參澤蘭葉湯

痢證總括

痢疾證治

槐連四物湯

芍藥湯

真人養藏湯

四物湯

十全大補湯

人參敗毒散

香連丸

加味四物湯

四物湯

瘡疾

加味生化湯

加味二陳湯

藿香正氣湯

生化湯

二陳湯

蓐勞虛羸總括

蓐勞虛羸證治

三合散

六君子湯

八珍湯

十全大補湯

益氣養勞湯

血崩

加味十全大補湯

加味逍遙散

十全大補湯

逍遙散

佛手散

失笑散

大便秘結

小便淋閉

加味四物湯

四物湯

小便頻數不禁淋瀝

黃耆當歸散

加味地黃湯

補中益氣湯

六味地黄湯

大便出血

加味苓連四物湯

苓連四物湯

歸脾湯

補中益氣湯

敗血成癰

加味生化湯

生化湯

產後虛實宜審

御纂醫宗金鑑卷四十八目錄

欽定四庫全書

御纂醫宗金鑑卷四十八

編輯婦科心法要訣

驚悸恍惚證治

茯神散

加味歸脾湯

產後血虛心氣弱驚悸恍惚不安寧養心須用茯神散
參耆地芍桂茯神琥珀龍齒歸牛膝憂思歸脾砂齒靈

註 產後血虛心氣不守神志怯弱故令驚悸恍惚不

寧也宜用茯神散其方乃人參黃耆熟地白芍桂
心茯神琥珀龍齒當歸牛膝也若因憂愁思慮傷
心脾者宜歸脾湯加硃砂龍齒治之

歸脾湯

方見首卷

妄言見鬼發狂證治

妙香散

產後譫狂見鬼神敗血冲心小調經心虛悶亂妙香散

二茯參耆遠志辰甘桂木麝山藥末歸地煎調效若神

註產後敗血冲心狂亂見鬼譫言妄語者宜服小調

經散若因心血虛神不守舍而悶亂者則用妙香散即茯苓茯神人參黃耆遠志辰砂甘草桔梗木香麝香山藥為散以當歸熟地煎湯調服即愈其效如神

虛煩證治

人參當歸湯

產後血虛煩短氣人參當歸湯最良參麥歸芍熟地桂
瘀血衝心失笑方去血過多煩躁甚須用當歸補血湯

註 產後血虛心煩短氣者宜人參當歸湯即人參麥

冬當歸白芍熟地肉桂也若因敗血沖心者宜服
失笑散若去血過多煩而躁者乃亡血證也宜當

歸補血湯

當歸補血湯

失笑散

方俱見首卷

發渴證治

參麥飲

加味四物湯

竹葉歸耆湯

氣虛津短參麥飲血虛四物粉麥煎渴甚竹葉歸耆效
參朮歸耆竹葉甘

註

產後氣虛津液不足而渴者宜參麥飲即人參麥
冬五味子也血虛而渴者宜四物湯加花粉麥冬

若渴甚不解者用竹葉歸耆湯其方乃人參白朮當歸黃耆竹葉甘草煎服也

四物湯 方見首卷

欬嗽證治

旋覆花湯

麥味地黄湯

加味佛手散

產後欬嗽感風寒旋覆花湯荆穗前麻杏半苓赤芍藥

五味甘草棗薑煎虛火上炎沖肺嗽麥味六黃滋化源
瘀血入肺佛手散加入桃紅杏貝延

註

產後效嗽若因起動太蚤感冒風寒者用旋覆花
湯即荆芥穗前胡麻黃杏仁半夏茯苓赤芍藥五
味子甘草旋覆棗薑也若因陰虛火炎上燬肺金
而嗽者宜六味地黃加麥冬五味子名麥味地黃
湯滋其化源若因瘀血上沖入肺而嗽者宜佛手
散加桃仁紅花杏仁川貝母延胡索以破其瘀其

嗽自愈

六味地黄湯

佛手散

方俱見首卷

衄血證治

人參澤蘭葉湯

產後口鼻黑而衄胃絕肺敗藥難醫參蘭丹膝生熟地
童便多冲糞萬一

註產後惡露不下虛火載血上行溢出鼻竅不循經

脈變黑色見於口鼻為熱極反兼水化故曰胃絕
肺敗藥難醫也或用人參澤蘭葉湯即人參澤蘭
葉丹皮牛膝生地熟地煎湯多冲童便飲之間有
得生者然亦希冀於萬一者耳

痢證總括

產後痢名產子痢飲食生冷寒暑干裏急後重有餘病
日久滑脫不足看赤黃稠黏多是熱清澈鴨溏定屬寒
寒熱溫清調補瀉虛實新久要詳參

註

產後痢者名產子痢多因飲食不調貪食生冷或起居不慎衝寒受暑所致若腹中疴痛裏急後重者屬有餘之證若日久虛寒滑脫者屬不足之證痢色黃赤稠黏多屬於熱清稀澄澈如鴨糞者則屬於寒治之之法熱者清之寒者溫之冷熱不和者調之虛者補之實者瀉之虛實新久之間宜細心詳參也

痢疾證治

槐連四物湯

芍藥湯

真人養藏湯

熱痢槐連四物效冷熱有餘芍藥湯芍藥苓連歸木草
枳桂墜楨痛大黃虛寒滑脫參朮桂芍藥訶蔻廣木香
甘草粟殼名養藏日久十全大補良

註 熱者清之故熱痢宜槐連四物湯即四物湯加槐

花黃連以清熱而堅腸也冷熱不和者調之故宜

芍藥湯即白芍藥黃芩黃連當歸木香甘草肉桂
枳榔墜者倍加枳榔痛加生大黃也若虛寒滑脫
則宜溫補而固澁之宜真人養藏湯即人參白朮
白芍藥肉桂肉豆蔻訶子木香甘草罌粟殼同煎
服也若日久不止氣血大虛宜十全大補湯補之

四物湯

十全大補湯

方俱見首卷

人參敗毒散

香連丸

加味四物湯

有表痢用敗毒散羌獨枳梗共柴前參苓芍草薑葱引
暑濕成痢用香連血滲大腸成血痢四物膠榆餘鯛添

註

外感風寒成痢者宜人參敗毒散即羌活獨活枳
殼桔梗柴胡前胡人參茯苓川芎甘草薑葱引也
若因暑濕致痢宜香連丸即黃連木香為丸也若
敗血滲入大腸成血痢者宜四物加阿膠地榆血

餘烏鰂魚骨服之

四物湯

方見首卷

瘧疾

加味生化湯

加味二陳湯

藿香正氣湯

產後瘧多因瘀血榮衛不和熱又寒生化湯中加柴甲
痰食二陳查朴添外感不正正氣散陳半苓朮蘇朴甘

腹皮桔梗藿香芷引加薑棗一同煎

註

產後患瘧多因瘀血停留榮衛不和故寒熱往來也宜用生化湯加柴胡鱉甲服之若因痰飲食積者宜二陳湯加山查厚朴若果外感風寒方可用藿香正氣散治之其方即陳皮半夏茯苓白朮蘇葉厚朴甘草大腹皮桔梗藿香白芷也

二陳湯

方見三卷

蓐勞虛羸總括

產後失調氣血弱風寒外客內停瘀飲食過傷兼勞怒
不足之中挾有餘寒熱往來臍腹痛懶食多眠頭暈迷
骨蒸盜汗痰嗽喘面黃肌瘦力難支蓐勞先須調脾胃
後調榮衛補其虛

註

產後氣血兩虛起居不慎風寒外襲瘀血內停更
或飲食厚味過傷憂勞忿怒乃不足之中挾有餘
之證致生寒熱往來臍腹痛懶進飲食喜眠卧
起則頭暈昏迷骨蒸潮熱盜汗自汗痰喘咳嗽面

色萎黃肌肉削瘦氣力難支名為蓐勞醫治甚難
凡欲療斯疾者必當先調理其脾胃使飲食強健
能勝藥力然後調其榮衛補其虛損始能痊愈

蓐勞虛羸證治

三合散

扶脾益胃六君子穀化精微氣血強能食漸覺精神爽
調衛和榮三合良八珍去朮小柴共隨證加減效非常
病退虛羸補氣血八珍十補養榮方

註

產後蓐勞治法當先扶脾益胃宜六君子湯加減
用之使脾胃強壯能食能消則後天水穀之氣化
生精液氣血自然壯盛精神自然漸爽然後調其
衛氣和其榮血宜三合散即八珍湯去白朮加小
柴胡湯乃人參柴胡黃芩半夏甘草也隨證加減
治之如寒熱往來臍腹脹痛則去人參黃芩生地
加延胡桃仁如懶食喜睡頭眩則去柴胡加黃耆
縮砂陳皮如骨蒸盜汗自汗則去川芎柴胡加鱉

甲地骨皮牡礪如痰喘咳嗽則去人參柴胡加麥
冬川貝母百合如面黃肌瘦乏力則去柴胡川芎
加黃耆倍用人參臨證消息之服後如諸證已痊
惟覺虛羸者則以八珍十全養榮等方培補之

六君子湯

八珍湯

十全大補湯

益氣養榮湯

方俱見首卷

血崩

加味十全大補湯

加味逍遙散

產後亡血更血崩血脫氣陷病非輕十全大補膠升續
棗仁山萸薑炭尋若因暴怒傷肝氣逍遙梔地白茅根
瘀停少腹多脹痛佛手失笑效如神

註 產後陰血已亡更患崩證則是血脫氣陷其病非

輕當峻補之宜用十全大補湯加阿膠升麻續斷

棗仁山萸炮薑炭以升補其脫陷可也若因暴怒傷肝血妄行者宜逍遙散加黑梔生地白茅根以清之若因內有停瘀者必多小腹脹痛當用佛手散失笑散以補而逐之

十全大補湯

逍遙散

佛手散

失笑散

方俱見首卷

大便秘結

產後去血亡津液胃燥腸枯大便難飲食如常無所苦
不須妄下損真元量其虛實通利導血旺津回聽自然

註

產後去血過傷其津液多致胃燥腸枯故令大便
秘結若飲食如常無脹滿之苦者不宜輕下反傷
元氣惟宜量其虛實用諸導法待血旺津回大便
自然順利也

小便淋閉

加味四物湯

產後淋閉腹脹痛熱邪挾血滲胞中四物蒲瞿桃仁膝
滑石甘草木香通

註

產後熱邪挾瘀血流滲胞中多令小便淋閉宜四
物湯加蒲黃瞿麥桃仁牛膝滑石甘草稍木香木
通治之

四物湯

方見首卷

小便頻數不禁淋瀝

黃耆當歸散

加味地黃湯

產後小便數且白腎虛不固自遺尿因產傷胞多淋瀝
頻數補中益氣宜胞傷黃耆當歸治參耆朮芍草當歸
不禁六味加桂附益智蠔蛸補骨脂

註

產後氣虛下陷多令小便頻數而色白腎虛不固
小便自遺因產時穩婆不慎傷其胞脬多致小便
淋瀝氣虛頻數者宜補中益氣湯升舉之傷胞淋

瀝者宜黃耆當歸散補之其方即黃耆當歸人參
白朮白芍甘草也引用豬草胞同煮服腎虛遺尿
不禁者宜六味地黃湯加肉桂附子名桂附地黃
湯更加益智仁桑螵蛸補骨脂治之

補中益氣湯

六味地黃湯

方俱見首卷

大便出血

加味芩連四物湯

產後便血大腸熱四物芩連酒炒黑地榆阿膠荊穗炒
蜜製升麻棕櫚灰脾虛不攝歸脾效氣虛下陷補中宜

註產後大便出血有因大腸經熱者宜芩連四物湯

黃芩黃連俱酒炒黑用更加地榆阿膠荊芥穗微
炒蜜製升麻棕櫚皮灰治之若因脾虛不能攝血
者宜歸脾湯中氣下陷者補中益氣湯

芩連四物湯

歸脾湯

補中益氣湯 方俱見首卷

敗血成癰

加味生化湯

榮氣不從逆肉理敗血留內發癰疽只用生化加連翹
銀花甘草乳沒宜切勿敗毒施過劑致令潰腐必難醫

註 產後氣血兩虛榮氣不從逆于肉理或敗血留內

結成癰疽者只宜用生化湯加連翹金銀花甘草
節乳香沒藥治之切不可用寒涼敗毒之藥恐潰

後腐爛必難醫治

產後虛實宜審

震亨產後惟大補從政莫作不足看二說須合形證脈
攻補虛實仔細參

註朱震亨云產後氣血兩虛惟宜大補雖有他證以

未治之張從政云產後慎不可作諸虛不足治之
二說各有偏處當合形證脈三者細參方不致誤

產後門彙方

開骨散

當歸 五錢

龜板 三錢
醋炙研

川芎 二錢

婦人髮 一團

水煎服

奪命散

沒藥

血竭 各等分

右研為細末，纔產下，便用童便、細酒各半盃煎一兩沸，調下二錢，良久再服，其惡血自下，行便不衝。

上免生百疾

清魂散

澤蘭葉

人參 各二錢

川芎 五錢

荊芥穗 一兩

甘草 二錢

炙

右為末用溫酒熱湯各半盃調一錢灌之下咽眼
即開氣定即醒

大巖蜜湯

當歸

熟地

白芍

各二錢

乾薑

肉桂

各一錢

吳茱萸

獨活

遠志

炙

細辛

甘草

各八分
炙

右水煎服

香桂散

當歸

肉桂

川芎 各等分

右為末酒調服

延胡索散

當歸

赤芍

生蒲黃

桂心

琥珀

紅花

延胡索 各等分

右以好醋浸一宿焙乾為末每服二錢酒調

起痛散

當歸

官桂

白朮

黃耆

獨活

牛膝

生薑

各五錢

甘草

炙

薤白

各三錢半

桑寄生

五錢

右咬咀每服五錢水煎服

丁香豆蔻散

公丁香

白豆蔻仁

伏龍肝 各等分

右為末生薑湯點服

茹橘飲

竹茹

橘紅 各三錢

乾柿 一枚

水薑煎服

參附湯

人參 一兩

附子 五錢
炮

右作一服薑棗水煎徐徐服

去人參加黃耆名耆附湯

二味參蘇飲

人參 一兩
為末

蘇木 二兩

右以蘇木煎湯冲人參末服

枳朮湯

枳實 二兩
炒

白朮 二兩
土炒

水薑煎服

小調中湯

茯苓

當歸

白芍

陳皮 各一錢

白朮

一錢五分

右作一劑煎湯服

小調經散

白芍

當歸

沒藥

琥珀

桂心

各一錢

細辛

麝香

各五分

右為細末每服五分薑汁溫酒各少許調服

更生散

當歸

生地

川芎

人參

各二錢

荊芥穗

三錢

乾薑

八分
炮

水煎服

當歸六黃湯

當歸

熟地
自製

黃耆
各二錢
炙

生地

黃蘗

炒黑

黃芩
炒黑

黃連

各一錢
炒黑

右水煎服

黃耆湯

黃耆 三錢

牡蠣粉 二錢

白朮

二錢
土炒

茯苓 一錢

麥冬

二錢

熟地 三錢

防風

一錢

甘草 七分

右加浮小麥一合煎服

七珍散

人參

石菖蒲

生地

川芎 各一兩

細辛 一錢

防風

辰砂

各五錢
另研

右為細末每服一錢薄荷煎湯調服

茯神散

茯神

一兩
去木

人參

黃耆

炙

赤芍

牛膝

琥珀

龍齒

各一錢五分
研

生地

一兩五錢

桂心 五錢

當歸 二兩

右為末每服三錢水煎服

妙香散

甘草 五錢
炒

遠志 製去心

山藥 薑汁炙

茯苓

茯神 去木

黃耆 各一兩
炙

人參

桔梗 各五錢

辰砂 三錢
另研

麝香 二錢
另研

木香 一錢五分

右為細末每服二錢當歸熟地煎湯調下

參麥飲

人參

麥冬

右水煎服

人參當歸湯

人參

當歸

熟地

麥冬

白芍 各二錢

五味子 三分

桂枝 一錢

右剉水煎服

竹葉歸耆湯

人參

白朮 土炒

當歸

黃耆 各二錢

竹葉 二十片

甘草 五分

右剉水煎服

旋覆花湯

旋覆花

赤芍藥

荊芥穗

半夏麩

前胡

甘草

茯苓

五味子

杏仁

去皮尖麩炒

麻黃

各等分

右㕮咀每服四錢水一盞半生薑三片棗一枚煎

至七分去滓食前溫服有汗不宜用

人參澤蘭葉湯

人參 五錢

澤蘭葉

丹皮

牛膝 各二錢

生地 三錢

熟地 五錢

藕節五枚煎冲童便服

槐連四物湯

當歸

川芎

赤芍藥

生地

槐花

黃連

各一錢
炒

御米殼

五分
去蒂蜜炙

右剉水煎服

芍藥湯

芍藥

炒

當歸

黃連

各半兩
炒

檳榔

木香

甘草

各二錢
炙

桂

二錢五分

黃芩

三錢
炒

右每服半兩水煎如不減加大黃此證又有因中
氣虛弱脾氣鬱結者治當審察

真人養藏湯

人參

白朮

白芍藥

各二錢

肉桂

肉苳蔻

訶子

煨 各一錢

木香

甘草

罌粟殼

各八分

右判薑棗煎服

人參敗毒散

羌活

獨活

柴胡

前胡 各一錢五分

枳殼

桔梗

人參

茯苓 各一錢

川芎 八分

甘草 五分

右判薑葱煎服

香連丸

黃連

十二兩
淨

吳茱萸

十兩
去枝梗

右先將二味用熱水拌和入磁器內置熱湯炖一日同炒至黃連紫黃色去茱萸用連為末每末四兩入木香末一兩淡醋米飲為丸梧桐子大每服二三十九滾湯下久痢中氣下陷者用補中益氣湯下中氣虛者用四君子下中氣虛寒者加薑桂

藿香正氣散

藿香

一錢五分

桔梗

大腹皮

紫蘇

茯苓

白朮

炒

白芷

半夏麩

陳皮

厚朴

各一錢

甘草

五分

右剉加薑棗水煎服

三合散

當歸

白芍

茯苓

熟地

各一兩

柴胡

人參

各一兩五錢

黃芩

半夏

製

甘草

各六錢

川芎

一兩

右為粗末每服一兩水一鍾半煎服日三

黃耆當歸散

人參

白朮

土炒

黃耆

當歸

白芍 各三錢

甘草 八分

右剉薑棗水煎服

桂附地黄湯

熟地 四錢

山萸肉

山藥 各二錢

丹皮

澤瀉

茯苓 各一錢五分

附子 製

肉桂 各一錢

右劉水煎服

回生丹

錦紋大黃

一觔為末

蘇木

三兩三碗

聽用打碎用河水五碗煎

大黑豆

三升豆不用

將殼晒干其汁留用殼用絹袋盛殼同豆煮熟去

紅花

三兩汁聽用

炒黃色入好酒四碗煎三五滾去渣取

米醋

九觔陳者佳

將大黃末一觔入淨鍋下米醋三觔文火熬之以

長木筋不住手攪之成膏再加醋三觔熬之又加

醋三勛次第加畢然後下黑豆汁三碗再熬次下蘇木汁次下紅花汁熬成大黃膏取入瓦盆盛之大黃鍋粑亦鏟下入後藥同磨

人參

當歸

酒洗

川芎

酒洗

香附

醋炒

延胡索

酒炒

蒼朮

米泔浸炒

蒲黃

隔紙炒

茯苓

桃仁

各一兩
去皮尖油

川牛膝

五錢
酒洗

甘草
炙

地榆
酒洗

川羌活

廣橘紅

白芍
各五錢
酒炒

木瓜

青皮
各三錢
去穰炒

乳香

沒藥
各二錢

益母草
三兩

木香
四錢

白朮
三錢
米泔浸炒

烏藥
二兩五錢
去皮

良薑
四錢

馬鞭草
五錢

秋葵子
三錢

熟地

一兩酒浸九次
蒸臙如法製就

三稜

五錢
醋浸透紙裏煨

五靈脂

五錢
醋煮
化焙乾研細

山萸肉

五錢
酒浸蒸搗

右三十味并前黑豆殼共晒為末入石臼內下大

黃膏拌勻再下煉熟蜜一斤共搗千杵取起為丸

每丸重二錢七八分靜室陰乾須二十餘日不可

日晒不可火烘乾後只重二錢有零鑠蠟護之即

蠟丸也用時去蠟殼調服

御纂醫宗金鑑卷四十八

欽定四庫全書

御纂醫宗金鑑卷四十九

編輯婦科心法要訣目錄

乳證門

乳汁不行證治

加味四物湯

湧泉散

乳汁自湧證治

兔懷散

麥芽煎

乳癰吹乳乳巖妬乳乳懸總括

乳癰證治

消毒飲

加味消毒飲

益氣養榮湯

吹乳證治

栝蒌散

外敷法

乳巖證治

十六味流氣飲

青皮甘草散

十全大補湯

八珍湯

歸脾湯

妬乳乳懸證治

鹿角散

連翹散

芎歸飲

前陰諸證門

陰腫證治

龍膽湯

薰洗法

騰熨法

陰痛證治

加味逍遙散

乳香四物敷法

逍遙散

四物湯

陰癢證治

桃仁雄黃膏

逍遙散

龍膽瀉肝湯

陰挺證治

蛇床洗法

藜蘆敷法

逍遙散

龍膽瀉肝湯

陰瘡證治

加味四物湯

四物湯

加味道遙散

補中益氣湯

陰痔證治

烏頭薰法

逍遙散

歸脾湯

補中益氣湯

陰冷證治

溫中坐藥

桂附地黄丸

陰吹證治

膏髮煎

十全大補湯

交接出血證治

加味歸脾湯

桂心釜墨散

雜證門

熱入血室

加味小柴胡湯

刺期門法

清熱行血湯

血分水分總括

血分證治

加味小調經散

水分證治

茯苓導水丸

夢與鬼交證治

加味歸脾湯

歸脾湯

梅核氣證治

半夏厚樸湯

血風瘡證治

加味逍遙散

益氣養榮湯

臙瘡證治

桂附地黄丸

人參敗毒散

補中益氣湯

六味地黄丸

足跟痛證治

六味地黄丸

八珍湯

御纂醫宗金鑑卷四十九目錄

欽定四庫全書

御纂醫宗金鑑卷四十九

編輯婦科心法要訣

乳證門

乳汁不行證治

加味四物湯

產後血虛乳汁少四物花粉不留行木通豬蹄湯熬服
葱白煎湯乳房淋

註 產後乳汁不行因去血過多血少不行者宜四物湯加花粉王不留行木通豬蹄熬湯煎藥服外用葱白煎湯時時淋洗乳房以通其氣

湧泉散

氣衄壅塞乳脹痛湧泉散用白丁香王不留行天花粉漏蘆殭蠶豬蹄湯

註 產後乳汁不行因瘀血停留氣衄壅滯者其乳必脹痛宜用湧泉散即白丁香王不留行花粉漏蘆

殭蠶豬蹄湯煎服也

乳汁自湧證治

兔懷散

麥芽煎

產後乳汁暴湧出十全大補倍參者食少乳多欲迴乳
兔懷紅花歸芎膝無兒食乳乳欲斷炒麥芽湯頻宜服

註產後乳汁暴湧不止者乃氣血大虛宜十全大補

湯倍用人參黃耆若食少乳多欲迴其乳者宜兔

懷散即紅花歸尾赤芍牛膝也若無兒食乳欲斷
乳者用麥芽炒熟熬湯作茶飲之

乳證總括

乳房忽然紅腫痛往來寒熱乳癰成乳被兒吹因結核
堅硬不通吹乳名初起結核不腫痛年深內潰乳巖凶
乳頭生瘡名妬乳細長垂痛乳懸稱

註
婦人乳房忽然紅腫堅硬疼痛增寒壯熱頭痛者
此欲成乳癰也若乳兒之時乳被兒口中氣吹以

致乳管不通結核者名曰吹乳更有乳內結核如
圍棋子不腫不痛但堅硬不散日久內潰者謂之
乳巖其證甚凶若乳頭生小細瘡痛者為妬乳若
瘀血上攻乳房忽然細小下垂長過於腹此名乳
懸惟產後有之

乳癰證治

消毒飲

乳癰初起消毒飲青芷歸柴浙貝蠶花粉銀花甘草節

寒熱荆防羌獨添膿成皂刺穿山甲潰後益氣養榮煎

註

乳癰乃陽明厥陰二經風熱壅盛初起宜服消毒
飲即青皮白芷當歸柴胡浙貝母殭蠶花粉金銀
花甘草節也若兼增寒壯熱者加荆芥防風羌活
獨活以解散之若服後不消其膿已成者宜加皂
角刺穿山甲以穿發之若潰後氣血虛者宜益氣
養榮湯培補之他如潰久膿清不斂又須急服大
劑參耆桂附矣

益氣養榮湯

方見前首卷彙方內

吹乳證治

栝萋散

外敷法

吹乳結核栝萋散乳沒歸甘用酒熬更加皂刺名立效
已成膿潰未成消外敷星夏蠶止刺草烏為末蜜葱調

註

吹乳結核不散者當早消之久則成癰宜用栝萋
散即栝萋實乳香沒藥當歸甘草酒熬服也若服

後不散者加皂角刺名立效散膿成者潰未成者
消外用南星半夏殭蠶白芷皂角刺草烏為末用
葱汁合蜜調敷

乳巖證治

十六味流氣飲

青皮甘草散

乳巖鬱怒損肝脾流氣飲歸芍參耆芍防蘇芷枳桔草
檳榔烏樸桂通隨外熨木香生地餅青皮甘草服無時

潰後不愈須培補十全八珍或歸脾

註 乳巖之證初起結核如圍棋子大不痛不癢五七

年或十餘年從內潰破嵌空玲瓏洞竅深陷有如

山巖故名乳巖皆緣抑鬱不舒或性急多怒傷損

肝脾所致宜速服十六味流氣飲其方即當歸白

芍人參黃耆川芎防風蘓葉白芷枳殼桔梗甘草

檳榔烏藥厚樸官桂木通外以木香生地搗餅以

熱器熨之且不時以青皮甘草為末煎濃薑湯調

服戒七情遠葷味解開鬱怒方始能愈若潰後久
不愈惟宜培補其氣血或十全大補湯八珍湯歸
脾湯選用之

十全大補湯

八珍湯

歸脾湯 方俱見首卷

妬乳乳懸證治

鹿角散

連翹散

妬乳甘草鹿角散雞子黃調炙敷之連翹散防升元芍
斂射消黃甘杏宜瘀血上攻乳懸證芎歸湯飲更薰鼻
不應草麻貼頂上乳收即去莫遲遲

註

乳頭生瘡謂之妬乳宜鹿角散敷之即鹿角甘草
為末雞子黃調銅器內炙敷之內服連翹散即防
風升麻元參白芍白斂射干芒消大黃甘草杏仁
也若產後瘀血上攻兩乳細長下垂過腹者謂之

乳懸宜濃煎芎歸湯不時飲之以其餘藥薰鼻則
瘵散乳即上升如不上者更以草麻仁搗貼頂心
収即去之

芎歸飲

即佛手散方見首卷

乳證門彙方

消毒飲

青皮

白芷

當歸

柴胡

浙貝母

殭蠶

花粉

金銀花

甘草節 各等分

右剉水煎服

枯萋散

枯萋

乳香

沒藥

當歸

甘草 各等分

右為末酒煎服 加皂角刺名立效散

十六味流氣飲

當歸

白芍

人參

黃耆 各二錢

川芎

防風

蘇葉

白芷

枳殼

桔梗 各一錢

甘草

檳榔 各五分

烏藥

厚樸

官桂

木通

各八分

右剉每服五錢水煎服

青皮甘草散

青皮

甘草

各一錢

右為末煎濃薑湯調服

鹿角散

鹿角

甘草

各等分

右為末雞子黃調銅器內炙敷之

連翹散

防風

元參 各二錢

白歛

芒消

大黃

射干 各一錢

升麻 五分

白芍 一錢

甘草 五分

杏仁 二十粒

右剉薑水煎服

加味四物湯

當歸

白芍

熟地

川芎

花粉

王不留行

炒

木通

各二錢

右豬蹄熬湯煎藥服

湧泉散

白丁香

王不留行

花粉

漏蘆 各一錢

右豬蹄湯煎服

兔懷散

紅花

赤芍

歸尾

牛膝 各二錢

右剉水煎服

麥芽煎

麥芽 三兩

右一味水煎作茶飲

欽定四庫全書

卷四十九

前陰諸證門

陰腫證治

龍膽瀉肝湯

薰洗法

騰熨法

婦人疝瘕兩拘痛玉門腫脹墜而疼濕熱龍膽瀉肝治
導赤車前澤瀉芩當歸梔子龍膽草氣虛下陷補中升
艾防大戟熬湯洗枳實陳皮炒熱騰

註

婦人子戶腫脹墜痛及兩拘疼痛者謂之疝瘕乃
肝心二經火盛濕熱下流所致宜服龍膽瀉肝湯
其方即導赤散生地木通甘草再加車前子澤瀉
黃芩當歸黑梔子龍膽草也若因中氣素虛下陷
重墜者用補中益氣湯以升舉之外用蘄艾防風
大戟熬湯薰洗更以枳實陳皮二味為末炒熱騰
之其腫自消而痛自定也

陰痛證治

加味道遙散

乳香四物敷法

陰中痛名小戶嫁痛極手足不能舒內服加味道遙散
四物乳香搗餅敷

註

婦人陰中作痛名小戶嫁痛痛極往往手足不能
伸舒由鬱熱傷損肝脾濕熱下注所致宜內服道
遙散加丹皮梔子外以四物湯料合乳香搗餅納
陰中其痛即定

逍遙散

四物湯

俱見首卷

陰癢證治

桃仁雄黃膏

濕熱生蟲陰戶癢內服逍遙龍膽方桃仁膏合雄黃末
雞肝切片納中央

註

婦人陰癢多因濕熱生蟲甚則肢體倦怠小便淋
瀉宜服逍遙散龍膽瀉肝湯外以桃仁研膏合雄

黃耒雞肝切片醃藥納戶中其蟲一聞肝腥皆鑽
肝內吮食將肝提出其病即愈

逍遙散

方見首卷

龍膽瀉肝湯

方見前
陰腫條

陰挺證治

蛇床洗法

藜蘆敷法

陰挺下脫即癩疝突物如蛇或如菌濕熱腫痛溺赤數

氣虛重墜便長清氣虛補中青梔入濕熱龍膽瀉肝尋
外熬蛇床烏梅洗豬油藜蘆敷自升

註 婦人陰挺或因胞絡傷損或因分娩用力太過或

因氣虛下陷濕熱下注陰中突出一物如蛇或如
菌如雞冠者即古之癩疝類也屬熱者必腫痛小
便赤數宜龍膽瀉肝湯屬虛者必重墜小便清長
宜補中益氣湯加青皮梔子外用蛇床子烏梅熬
水薰洗之更以豬油調藜蘆末敷之無不愈者

逍遙散

方見首卷

龍膽瀉肝湯

方見前
陰腫條

陰瘡證治

加味四物湯

蟲蝕成瘡膿水淋時疼時癢若蟲行少腹脹悶溺赤瀉
食少體倦晡熱蒸四物柴梔丹膽草滑腐逍遙墜補中
註 婦人陰瘡名曰蟲由七情鬱火傷損肝脾氣血凝
滯濕熱下注久而蟲生蟲蝕成瘡膿水淋漓時疼

時癢有若蟲行少腹脹悶溺赤頻數食少體倦內
熱晡熱經候不調赤白帶下種種證見宜分治之
腫痛者用四物湯加柴胡梔子龍膽草若潰爛出
水而痛者用加味道遙散若重墜者用補中益氣
湯

加味道遙散

方見前
陰痛條

四物湯

補中益氣湯

方俱見首卷

陰痔證治

烏頭薰法

陰中突肉名陰痔或名茄子疾俗稱黃水易治白難治
烏頭存性醋熬薰內服逍遙與龍膽補中歸脾酌量行
註 婦人陰中有肉突出者名曰陰痔俗稱茄子疾也

流黃水者易治流白水者難治用烏頭燒存性釀
醋熬薰內服逍遙散補中益氣湯歸脾湯量其虛
實酌而行之

逍遙散

歸脾湯

補中益氣湯 方俱見首卷

陰冷證治

溫中坐藥

陰冷風寒客子臟桂附地黃丸最宜遠志乾薑蛇床子
吳萸為末裏納之

註 婦人陰冷皆由風寒乘虛客於子臟久之血凝氣

滯多變他證且艱於受孕宜多服桂附地黃丸外
以遠志乾薑蛇床子吳茱萸研細綿裹納陰中日

二易

桂附地黃丸 方見首卷

陰吹證治

膏髮煎

胃氣下泄陰吹喧金匱方用膏髮煎豬膏亂髮同煎服
導後溺去法通元氣虛下陷大補治升提下陷升柴添

註

婦人陰吹者陰中時時氣出有聲如穀道轉矢氣
狀金匱謂由穀氣實胃氣下泄用膏髮煎即豬膏
煎亂髮服也導病後小便而出其法甚奧若氣血
大虛中氣下陷者宜十全大補湯加升麻柴胡以
升提之

十全大補湯

方見首卷

交接出血證治

加味歸脾湯

桂心釜墨散

交接出血傷心脾伏龍肝末入歸脾千金桂心釜底墨
酒服方寸匕相宜

註

婦人每交接輒出血者由傷損心脾二經也宜用
歸脾湯加伏龍肝煎服或用千金方中桂心釜底
墨二味為末酒冲服方寸匕自愈

前陰諸證門彙方

龍膽瀉肝湯

生地 二錢

木通

車前子

各一錢
五分

澤瀉

黃芩

各二錢

當歸 二錢

黑梔仁

龍膽草 各一錢

生甘草

五分

右燈草一團水煎服

洗方

防風 三錢

蘄艾 一團

大戟 一錢

右熬湯薰洗

騰方

枳實

廣皮 各等分

右為末炒熱騰之

敷方

四物湯 一料

乳香 一錢

右搗餅納戶中其痛即定

桃仁雄黃膏

桃仁

五錢
研膏

雄黃

三錢
末

右二味研勻用雞肫肝切片蘸藥納戶中其蟲即
鑽入肝而癢自止

陰挺洗法

蛇床子

五錢

烏梅

九枚

右二味熬湯乘熱薰洗

敷方

藜蘆

為末

右用豬脂油調敷自收

陰痔薰法

烏頭

右用醞醋熬薰自消

溫中坐藥方

遠志

乾薑

吳茱萸

蛇床子 各等分

右為末綿裹納戶內一日二次換膏髮煎

婦人亂髮 一團

右用豬膏熬化服之小便利則愈

桂心釜墨散

桂心

釜底墨 各等分

右二味為末酒服方寸匕

雜證門

熱入血室

加味小柴胡湯

熱入血室經適斷邪熱乘虛血室潛寒熱有時如瘡狀
小柴胡加歸地丹

註

金匱云婦人中風七八日續來寒熱發作有時經
水適斷此為熱入血室其血必結故使如瘡狀發
作有時小柴胡湯主之此言邪熱未盡值經來乘

虛入於血室之間而潛藏之故令血結而寒熱有時如瘡狀也血室肝主之肝與膽為表裏膽因肝受邪而病寒熱故用小柴胡湯主之也加當歸生地丹皮者所以清血分之熱也

小柴胡湯

方見首卷柴胡四物湯註中

熱入血室經適來晝日明了夜譫妄無犯胃氣上二焦熱隨血去自無恙

註

金匱云婦人傷寒發熱經水適來晝日明了夜則

譫語如見鬼狀此為熱入血室治之無犯胃氣及
上二焦必自愈也此言熱雖入於血室然經行不
斷則熱不留結勿謂譫妄遂以消黃犯其胃氣刺
傷榮血小柴和解犯上二焦但俟其熱隨血去病
必自愈傷寒論曰血自下下者愈此之謂也

刺期門法

清熱行血湯

熱入血室成結胸下血譫語頭汗出二者皆當刺期門

隨其實取泄而去清熱行血桃紅丹靈脂地草穿山赤

註金匱云婦人中風發熱惡寒經水適來得七八日

熱除脈遲身涼胸脇滿如結胸狀譫語者此為熱入血室也當刺期門隨其實而取之又云陽明病下血譫語者此為熱入血室但頭汗出當刺期門隨其實而瀉之澱然汗出者愈此二條一言適來即斷血結在裏為實證一言陽明病亦有熱入血室但下血頭汗出為不同故為熱入血室亦由肝

實故均謂當刺期門也不能刺者以清熱行血湯治之其方即桃仁紅花丹皮五靈脂生地甘草穿山甲赤芍也合四證觀之大抵有寒熱如瘧之證方可用小柴胡否則或不藥自愈或刺期門而清熱行血以隨其實而瀉之此仲景心法也不得概以小柴胡治之也

血分水分總括

經水先閉後病腫任衝寒濕血壅經先發水腫後經閉

水溢皮膚泛濫行血分難醫水易治二者詳參要辨明

註

婦人經水先閉後病腫者乃寒濕傷於衝任血壅
經隧也名曰血分若先病腫而後經閉者乃土不
制水水邪泛濫溢於皮膚也名曰水分血分難治
水分易治二者須當詳辨

血分證治

加味小調經散

血分血壅不能行四肢浮腫病非輕但使經通腫自散

紅丹膝入小調經

註

血分腫乃血壅不行流於四肢故令浮腫此不必
治腫但調其經經通其腫自消宜小調經散加紅
花丹皮牛膝治之

小調經散

方見三卷浮腫

水分證治

先腫後閉名水分停飲膀胱氣不行水消腫退經自至
茯苓導水效通神

註

水分腫乃水飲內停膀胱之氣化不行水溢皮膚故令浮腫經閉也此但宜治水水消腫退其經自通用茯苓導水丸治之

茯苓導水湯

方見胎前門子腫條

夢與鬼交證治

加味歸脾湯

獨笑獨悲畏見人神虛夜夢鬼邪侵歸脾湯調辰砂珀定志清心魂魄寧

註
婦人七情內傷虧損心脾神無所護鬼邪干正魂
魄不寧故夜夢鬼交獨笑獨悲如有對忤是其候
也宜用歸脾湯調辰砂琥珀末服之則志定心清
魂魄安而無邪夢矣

歸脾湯

方見首卷

梅核氣證治

半夏厚樸湯

婦人咽中如炙轆或如梅核結咽間半夏厚樸湯最效

半樸蘇茯苓薑引煎

註

千金方云咽中帖帖如有炙肉吐之不出吞之不下即所謂咽中如有炙嚮也俗云梅核氣蓋因內傷七情外傷寒冷所致宜用金匱半夏厚樸湯主之即半夏厚樸蘇茯苓生薑煎也

血風瘡證治

加味逍遙散

遍身痞癩如丹毒癢痛無時搔作瘡血風風濕兼血燥

加味逍遙連地方愈後白屑肌膚強血虛不潤養榮湯

註 婦人血風瘡證徧身起痞癩如丹毒狀或癢或痛

搔之則成瘡由風濕血燥所致宜用加味逍遙散

加黃連生地如瘡結痂而愈復起白屑肌膚強硬

者乃血少不潤也宜服益氣養榮湯

加味逍遙散

方見前
陰痛條

益氣養榮湯

方見首卷

瘰癧證治

桂附地黄丸

憂思鬱怒肝脾損濕熱生瘡長兩脇外屬三陽為易治
內屬三陰治每難初起紅腫敗毒散膿水淋漓補中煎
晡熱陰虛宜六味食少畏寒桂附丸

註

婦人憂思鬱怒傷損肝脾或飲食不調損其胃氣
則濕熱下注更被寒濕外邪所客則必兩脇生瘡
外脇是三陽經尚屬易治若生於內脇屬是三陰
經每多難愈初起紅腫宜人參敗毒散潰後膿水

淋漓宜補中益氣湯若更晡熱是為陰虧宜兼服

六味地黃丸若食少體倦畏寒則為真陽不足宜

服桂附地黃丸即六味地黃丸加肉桂附子也

人參敗毒散

方見產後痢條

補中益氣湯

方見首卷血崩條

六味地黃丸

方見首卷

足跟痛證治

督脈發源腎經過三陰虛熱足跟疼六味地黃滋真水

腫潰流膿用八珍

註

足跟乃督脈發源之地足少陰腎經從此所過若
三陰虛熱則足跟疼痛宜用大劑六味地黃丸料
煎服以峻補其真水若痛久不愈腫潰流膿者宜
服八珍湯以大補其氣血

雜證門彙方

半夏厚樸湯

半夏

厚樸

蘇葉

茯苓各二錢

右生薑煎服

清熱行血湯

桃仁一錢

紅花一錢

丹皮

五靈脂

生地各二錢

甘草五分

穿山甲

赤芍各一錢

右水煎服

八珍湯方見首卷



御纂醫宗金鑑卷四十九